ウニの発生実験

2021年 7月 県立川越女子高校
8月 東邦大学、早稲田大学
9月 東邦大学
10月 川口市立高校

実習スケジュールの例

- 1日目 午前 ウニと実験器具の配達
午後 採卵と受精・卵割の実験観察
- 2日目 午前 ふ化・胞胚の観察
午後 原腸胚の観察
- 3日目 プルテウス幼生の観察
(1ヶ月ほど飼育した材料を送付して)
幼生の成長と成体への変態・稚ウニの観察

*日程のない場合は、胚や幼生を一緒に送付して、1日で観察を終わらせることも可能。

1日目 採卵

バフンウニ
雌1匹（紙タオル）
雄1匹（新聞紙）

未受精卵
精子

海水
採卵用器具

Zoomで実演される方法を見ながら、一緒に採卵します。

海水の入った試験管を用意

ウニの口を外す

塩化カリウムの液を入れる

雌は卵を（右側）
雄は精子を（左側）放出

1日目 受精・卵割の観察

Zoomを通しての説明通りに、未受精卵に精子を加え、受精と卵割を観察
その後の発生を観察

2日目 フ化した胞胚、原腸胚の観察

3日目 9:00- 10:30 プルテウス幼生の観察 送付された幼生と稚ウニの観察

海洋酸性化のウニの発生への影響

CO₂により酸性化した海水を送付
pH 7, 6.5, 6 と対照の自然海水pH 8の4本を2セット

受精への影響

2日目 9:00- 10:00 の時間に

各pHの海水に精子を希釈し、未受精卵を加え、受精率を調べる。

pH 8

ほとんどが受精

pH 6.5

多くは受精しない

pH 6

まったく受精しない

胚発生への影響

1日目 13:00- 17:00の時間に

受精卵を各pHの海水に加え発生させる。

3日目 9:00- 10:30の時間に

各pHの海水で発生させた胚の形態を調べる。

pH 8

プルテウス幼生

pH 7

発生が遅れる
骨格は？

pH 6.5

繊毛で動くものはあるが、形が異常

pH 6

卵割していない

東邦大学実習（リモート）
2021 9 10-12

ウニの発生

お茶の水女子大学
湾岸生物教育研究センター
清本 正人

1

箱の中身

ムラサキウニ

雌 3匹 (茶色のキムタオル)
雄 3匹 (新聞紙)

ウニの形態の図

ウニ殻 ムラサキウニ
タコノマクラ

①採卵採精用器具
ハサミ、ピンセット、
KCl液、スポイト

②採卵採精用容器
100 mL 6個

②卵用 25 mL スポイト
精子用 シャーレ、
チューブ、スポイト

キタムラサキウニ卵
箱の外に

キタムラサキウニ精子
氷のそばに

墨海水

偏光板、
ビニールテープ

精子不活
性化液

ムラサキウニ幼生
と稚ウニ

幼生飼育用の海水
(100ml 3本)

2

ムラサキウニの採卵・採精

この他に用意するもの
 ・ウニを載せるバット
 ・300 mL程度のピーカー
 海水を入れる

- ・箱から雌のウニを取り出しバットに。
- ・ハサミ、ピンセット、KCl液、スポイトを用意。
- ・100 mL程度の容器に海水を目一杯入れる。
- ・バットの上で、口のまわりの皮をハサミで切り、ウニの口器を外す。ピンセットを使っても良い。口器を奥に押し込んではいけない。
- ・海水で、体内と表面をさっと洗う。

- ・海水が目一杯入った採卵用の容器に、ウニを裏返しにのせる。
- ・口を外した穴から、KCl (0.5 M) を数mL スポイトで入れる。
- ・放卵を観察する。
(放卵が終わったら、)
- ・容器の底に沈んだ卵を2-3mLピペットで吸い取り、海水の入った配分用の容器 (例えば25mL容器) に入れる。
(後述の精子は氷中が望ましいが、卵は15度以上に)

- ・同様の手順で雄のウニの放精を観察する。
- ・放精の観察はほどほどに、オスを空のシャーレに載せ、濃い精子液をためる。
- ・濃い精子液をピペットで吸い取り、マイクロチューブに入れる。氷中か4度に。

3

キタムラサキウニの未受精卵と精子も用意してあります。ムラサキウニと同様に受精、発生を観察してください。

ムラサキウニ (7月~8月)
Heliocidaris crassispina

キタムラサキウニ (9月~10月)
Mesocentrotus nudus

4

受精、発生の観察

- ・卵（25mL容器）を、卵用のスポイトで、海水を入れたシャーレに入れる。
- ・精子（マイクロチューブ）を、精子用のスポイトでほんの少しとり、海水を入れたシャーで希釈し、希釈した液を卵のシャーレに数滴入れる。
- ・攪拌し、時刻を記録する（受精した時刻）。

- ・未受精卵、受精卵をそれぞれホールスライドグラスに1滴載せ、カバーグラスをかけて観察。

受精膜、周りの精子、卵内の雌性前核、雄性前核（星状体）

- ・受精の過程を観察するには、
ホールスライドグラスに卵を1滴、カバーグラスなしでピントを合わせる。
希釈した精子液を1滴、卵の1滴のそばに載せる。
顕微鏡で観察しながら、鉛筆の先などで卵と精子の液をつなぎ、卵の周りに精子がやってきたところを観察する。

5

ゼリー層の観察

卵の周りには透明なゼリー層がある。ウニの場合、精子はゼリー層の物質により先体反応を起こし、受精できるようになる。卵が密集してもゼリー層の厚さだけ、一定の間隔があるのが観察される。墨海水（墨汁を混ぜた海水、海水で墨をすっても良い）中の卵を観察すると写真のようにゼリー層を確認できる。

- ・ホールスライドグラスではなく、平なスライドグラスを使う。ホールスライドグラスの裏側でも良い。
- ・未受精卵を1滴、墨海水を1滴、スライドグラスにとり、カバーグラスをかけて観察する。
- ・墨の粒子はゼリー層に入らないので、ゼリー層が白く抜けて見える。
- ・海水が多いと、墨海水が全体を覆ってうまく見えない。卵がカバーグラスとスライドグラスに挟まるくらいが良い。

6

精子の観察

生きた精子は活発に動くので観察しにくい。ここでは、尾部の鞭毛運動を阻害する液で動きを止めて観察する。頭部と尾部の間の中片（ミトコンドリアがある）まで確認できるはずですが、

- ・マイクロチューブの濃い精子液をスポイトで少量とり、精子不活性化液に入れ、攪拌する。
- ・その1滴をスライドガラスの平なところ（普通のスライドガラスか、ホールスライドガラスの裏側）にとり、カバーガラスをかけて観察する。
- ・10倍の対物レンズで、カバーガラスの縁を目印に、ピントを合わせる。さらに、40倍の対物レンズでピントを合わせる。絞りで見え方を調節する。

精子不活性化液
カリウムを増やし、
酸性にした人工海水

NaCl 425 mM
MgCl₂ 27 mM
MgSO₄ 29 mM
CaCl₂ 10 mM
NaHCO₃ 2.4mM
KCl 50 mM (通常10 mM)
MES 5mM
pH 6.0 (通常pH 8.0)

Bracho et al. 1997
Biochem. Biophys. Res.
com. 237, 59-62を改変

7

偏光による幼生骨格の観察

幼生骨格（骨片）は、炭酸カルシウムの結晶（方解石、カルサイト）。その性質（複屈折性）により、偏光を使うと光って見える。

- ・小さい偏光板（丸型）を接眼レンズの上のせ、ビニールテープで左右をとめる。大きい偏光板（四角）はステージの下の照明の上のせる。
- ・顕微鏡をのぞきながら接眼レンズを回転させ、視野がもっとも暗くなる場所で回転をとめる。この状態で、幼生の骨格が暗い視野の中で光って見える。絞りを全開にすると、組織の影が薄くなり骨片がよく光って見える。

偏光照明の原理

光は波の性質があり、普通的光源は様々な方向に振動した光の集まりである。偏光板は、その中のある一定方向に振動する光しか通さないで、偏光板を通り抜けた光はそらって一定の方向に振動している。これが偏光である。
この図のように、2枚の偏光板が直行していると、1枚目を通り抜けた光（偏）も2枚目の偏光板を通り抜けることができない。縦横縦横は、この状態になっているので、視野全体が暗くなっている。偏光板の間に、結晶のように分子が一定の配列を取るものがあると、振動面のそろった偏光がそこを通り抜ける時に、いろいろな方向に振動するようになる。このような性質を複屈折性と言う。骨片は炭酸カルシウム (CaCO₃) の結晶（方解石）であり、複屈折性を持つ。こうして、骨片を通り抜けた光の中には、2枚目の偏光板を通り抜けるような方向に振動するもの（青）もあるので、骨片が光って見える。

8